



LABORATOIRE D'ANALYSES LA SCALA

Préconisation pour la réalisation d'un test respiratoire de la recherche de *Helicobacter pylori* : TEST HELIKIT® ou INFAL® Adulte et Enfant

Ce test constitue à analyser l'air expiré afin de détecter la présence ou l'absence dans l'estomac d'une bactérie nommée *Helicobacter pylori*.

Cette bactérie est responsable de nombreuses pathologies gastriques qui se traduisent généralement par des douleurs gastriques.

Ce test doit être réalisé :

- ✓ 1 mois après l'arrêt de tout traitement antibiotique.
- ✓ 15 jours après l'arrêt des IPP (Inhibiteurs la pompe à protons).
- ✓ 1 semaine après l'arrêt des pansements gastriques.

En effet ces traitements interfèrent sur la présence d'*Helicobacter pylori* rendant le test faussement négatif.

- ✓ Se procurer le test HELIKIT® ou INFAL Adulte ou enfant À LA PHARMACIE.
- ✓ Se présenter à jeun (ni boisson, ni aliment, ni chewing-gum), et sans avoir fumé depuis la veille.
- ✓ Ne pas avoir brossé ses dents avant de venir au laboratoire.
- ✓ PREVOIR DE RESTER 40 MINUTES AU LABORATOIRE



LABORATOIRE D'ANALYSES LA SCALA

Préconisation pour la réalisation d'un test respiratoire de la recherche de *Helicobacter pylori* : TEST HELIKIT® ou INFAL® Adulte et Enfant

Ce test constitue à analyser l'air expiré afin de détecter la présence ou l'absence dans l'estomac d'une bactérie nommée *Helicobacter pylori*.

Cette bactérie est responsable de nombreuses pathologies gastriques qui se traduisent généralement par des douleurs gastriques.

Ce test doit être réalisé :

- ✓ 1 mois après l'arrêt de tout traitement antibiotique.
- ✓ 15 jours après l'arrêt des IPP (Inhibiteurs la pompe à protons).
- ✓ 1 semaine après l'arrêt des pansements gastriques.

En effet ces traitements interfèrent sur la présence d'*Helicobacter pylori* rendant le test faussement négatif.

- ✓ Se procurer le test HELIKIT® ou INFAL Adulte ou enfant À LA PHARMACIE.
- ✓ Se présenter à jeun (ni boisson, ni aliment, ni chewing-gum), et sans avoir fumé depuis la veille.
- ✓ Ne pas avoir brossé ses dents avant de venir au laboratoire.
- ✓ PREVOIR DE RESTER 40 MINUTES AU LABORATOIRE