



**Préconisation pour la réalisation
d'un examen génital**

- ✓ Eviter la toilette interne, les rapports sexuels, les traitements locaux (crème, gels, savons...) dans les 24 heures précédant l'examen pour les prélèvements vaginaux, cervico-vaginaux.
- ✓ Eviter la toilette locale depuis la veille ou au minimum 4h avant le prélèvement, en cas de lésions vulvaires chez la femme ou génitales chez l'homme
- ✓ Eviter le prélèvement pendant la période menstruelle (sauf avis contraire du prescripteur).
- ✓ Effectuer le prélèvement de préférence avant traitement ou à distance du traitement antibiotique/antifongique (Tt systémique en comprimés ou Tt local : crème, ovules) :
 - ▶ Au minimum 7 jours après la fin du traitement par antibiotique.
 - ▶ Au minimum 7 jours après la fin du traitement antifongique.
- ✓ Observer une rétention urinaire d'au moins 2 heures si prélèvement urétral ou recherche de Chlamydiae/Mycoplasmes sur 1^{er} jet urinaire.



**Préconisation pour la réalisation
d'un examen génital**

- ✓ Eviter la toilette interne, les rapports sexuels, les traitements locaux (crème, gels, savons...) dans les 24 heures précédant l'examen pour les prélèvements vaginaux, cervico-vaginaux.
- ✓ Eviter la toilette locale depuis la veille ou au minimum 4h avant le prélèvement, en cas de lésions vulvaires chez la femme ou génitales chez l'homme
- ✓ Eviter le prélèvement pendant la période menstruelle (sauf avis contraire du prescripteur).
- ✓ Effectuer le prélèvement de préférence avant traitement ou à distance du traitement antibiotique/antifongique (Tt systémique en comprimés ou Tt local : crème, ovules) :
 - ▶ Au minimum 7 jours après la fin du traitement par antibiotique.
 - ▶ Au minimum 7 jours après la fin du traitement antifongique.
- ✓ Observer une rétention urinaire d'au moins 2 heures si prélèvement urétral ou recherche de Chlamydiae/Mycoplasmes sur 1^{er} jet urinaire.