



Préparation patient et recueil de l'urine

Hygiène et qualité dès le prélèvement



Prélèvement sur la première miction du matin ou après 2h minimum de rétention urinaire (4 heures de préférence sauf symptômes urinaires importants ou mictions fréquentes) après lavage des mains.

Effectuer le prélèvement de préférence avant traitement ou à distance du traitement antibiotique :

- au minimum 7 jours après l'arrêt du traitement antibiotique,
- ou suivant la prescription médicale.

1. Chez la femme	2. Chez l'homme	3. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 2 ans
<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire par un mouvement d'avant en arrière en tenant les muqueuses écartées, - Eliminer le 1^{er} jet des urines dans les toilettes. - Uriner dans le flacon stérile. - Refermer soigneusement le flacon. (Ne pas soulever l'étiquette blanche.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire après avoir décalotté le prépuce. - Eliminer le 1^{er} jet des urines dans les toilettes. - Uriner dans le flacon stérile. - Refermer soigneusement le flacon. (Ne pas soulever l'étiquette blanche.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire. - Poser le collecteur à usage unique sur la peau (face adhésive) en prenant soin de vérifier que l'urine pourra bien s'écouler dans le collecteur. - Surveiller l'arrivée des urines car le collecteur doit être retiré au plus tard après 30 minutes. - Une fois le collecteur rempli, le décoller et le placer dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

⚠ Pour la recherche de **Chlamydia, Mycoplasme, Gonocoque**, recueillir le **premier jet** d'urines.

⚠ Pour la recherche de **Bilharziose** recueillir toute la première miction du matin après 15 minutes d'effort (course, escalier...) ou recueillir les urines de 24h dans un flacon fourni par le laboratoire.

Noter votre nom et prénom sur le flacon

Renseignements

Patient	Nom :	Prénom :	Nom de naissance :
Date de naissance	Sexe :	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> F
Prélèvement			
Date :	/	/	heure :

En cas de prélèvement à domicile, l'échantillon doit être apporté au laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement. Si le délai est plus long : conserver l'échantillon au réfrigérateur à +4°C maximum 4 heures avant transfert au laboratoire.



Préparation patient et recueil de l'urine

Hygiène et qualité dès le prélèvement



Prélèvement sur la première miction du matin ou après 2h minimum de rétention urinaire (4 heures de préférence sauf symptômes urinaires importants ou mictions fréquentes) après lavage des mains.

Effectuer le prélèvement de préférence avant traitement ou à distance du traitement antibiotique :

- au minimum 7 jours après l'arrêt du traitement antibiotique,
- ou suivant la prescription médicale.

1. Chez la femme	2. Chez l'homme	3. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 2 ans
<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire par un mouvement d'avant en arrière en tenant les muqueuses écartées, - Eliminer le 1^{er} jet des urines dans les toilettes. - Uriner dans le flacon stérile. - Refermer soigneusement le flacon. (Ne pas soulever l'étiquette blanche.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire après avoir décalotté le prépuce. - Eliminer le 1^{er} jet des urines dans les toilettes. - Uriner dans le flacon stérile. - Refermer soigneusement le flacon. (Ne pas soulever l'étiquette blanche.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire une toilette locale avec une lingette antiseptique fournie par le laboratoire. - Poser le collecteur à usage unique sur la peau (face adhésive) en prenant soin de vérifier que l'urine pourra bien s'écouler dans le collecteur. - Surveiller l'arrivée des urines car le collecteur doit être retiré au plus tard après 30 minutes. - Une fois le collecteur rempli, le décoller et le placer dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

⚠ Pour la recherche de **Chlamydia, Mycoplasme, Gonocoque**, recueillir le **premier jet** d'urines.

⚠ Pour la recherche de **Bilharziose** recueillir toute la première miction du matin après 15 minutes d'effort (course, escalier...) ou recueillir les urines de 24h dans un flacon fourni par le laboratoire.

Noter votre nom et prénom sur le flacon

Renseignements

Patient	Nom :	Prénom :	Nom de naissance :
Date de naissance	Sexe :	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> F
Prélèvement			
Date :	/	/	heure :

En cas de prélèvement à domicile, l'échantillon doit être apporté au laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement. Si le délai est plus long : conserver l'échantillon au réfrigérateur à +4°C maximum 4 heures avant transfert au laboratoire.